

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### **Clarityn 10 mg - Brausetabletten**

Wirkstoff: Loratadin

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen müssen Clarityn 10 mg – Brausetabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Clarityn 10 mg - Brausetabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten beachten?
3. Wie sind Clarityn 10 mg - Brausetabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Clarityn 10 mg - Brausetabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS SIND CLARITYN 10 MG - BRAUSETABLETTE UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Clarityn 10 mg - Brausetabletten gehören zur Gruppe der Antihistaminika. Antihistaminika helfen die Überempfindlichkeitserscheinungen (Allergien), die durch die Freisetzung eines Stoffes, genannt Histamin, der im eigenen Körper produziert wird, hervorgerufen werden, zu vermindern.

Clarityn 10 mg – Brausetabletten lindern Beschwerden bei allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) mit Begleiterscheinungen wie Niesreiz und Nasenlaufen sowie Juckreiz und Brennen in Nase und Augen.

Clarityn 10 mg - Brausetabletten sind auch zur Behandlung und Linderung der Beschwerden bei chronischem Nesselausschlag (Juckreiz, Rötung und Bläschen) geeignet.

Die Linderung hält einen ganzen Tag an und hilft Ihnen Ihrer normalen Tätigkeit tagsüber nachzugehen und nachts zu schlafen.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CLARITYN 10 MG – BRAUSETABLETTE BEACHTEN?**

#### **Clarityn 10 mg Brausetabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Loratadin oder einem der sonstigen Bestandteile von Clarityn 10 mg – Brausetabletten sind.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten ist erforderlich**

Bevor Sie Clarityn 10 mg - Brausetabletten einnehmen, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker:

- wenn Sie eine Leberfunktionsstörung haben.

#### **Bei Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Labortests:**

Wenn Sie einem Labor-Haut-Allergietest unterzogen werden, sollten Clarityn 10 mg - Brausetabletten mindestens 2 Tage vor einem geplanten Test abgesetzt werden, da dieses Medikament die Testergebnisse beeinflussen kann.

#### **Bei Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Clarityn 10 mg - Brausetabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Loratadin steigert nicht die Wirkung von gleichzeitig eingenommenem Alkohol.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Von einer Anwendung von Clarityn 10 mg - Brausetabletten während der Schwangerschaft wird abgeraten.

Von einer Anwendung von Clarityn 10 mg - Brausetabletten während der Stillzeit wird abgeraten. Loratadin geht in die Muttermilch über.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Die Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten in der empfohlenen Dosis verursacht voraussichtlich keine Benommenheit oder Verminderung Ihrer Aufmerksamkeit. Jedoch kann es bei manchen Personen in sehr seltenen Fällen zu Benommenheit kommen, was zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen führen kann.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Clarityn 10 mg - Brausetabletten:**

Clarityn 10 mg - Brausetabletten enthalten Lactose, Sorbitol und Saccharose. Sollte Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt haben, dass Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckerarten leiden, informieren Sie ihn bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Clarityn 10 mg - Brausetabletten**

Clarityn 10 mg - Brausetabletten enthalten Lactose-Monohydrat. Falls Ihnen bekannt ist, dass Sie bestimmte Zuckerarten nicht vertragen, informieren Sie Ihren Arzt darüber, bevor Sie dieses Arzneimittel verwenden.

### **3. WIE SIND CLARITYN 10 MG - BRAUSETABLETTEINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Clarityn 10 mg - Brausetabletten immer genau nach Anweisung des Arztes/Empfehlung des Apothekers ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Kinder (12 Jahre und älter):

Nehmen Sie eine Brausetablette einmal täglich in einem Glas Wasser aufgelöst ein, unabhängig von den Mahlzeiten.

Kinder von 2 bis 12 Jahren erhalten eine gewichtsbezogene Dosierung:

Bei einem Körpergewicht von über 30 kg:

Nehmen Sie eine Brausetablette einmal täglich in einem Glas Wasser aufgelöst ein, unabhängig von den Mahlzeiten.

Darf Kindern unter 12 Jahren nur über ärztliche Verschreibung verabreicht werden.

Patienten mit schwerer Leberschädigung:

Bei erwachsenen Patienten und Kindern über 30 kg Körpergewicht:  
Nehmen Sie eine Brausetablette alle zwei Tage aufgelöst in einem Glas Wasser ein, unabhängig von den Mahlzeiten.

Von einer Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten bei Kindern unter 2 Jahren wird abgeraten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Clarityn 10 mg - Brausetabletten eingenommen haben, als Sie sollten**

Nehmen Sie Clarityn 10 mg - Brausetabletten nur in der vorgegebenen Menge ein. Es werden bei irrtümlicher Überdosierung keine schwerwiegenden Nebenwirkungen erwartet.

Sollten Sie jedoch mehr Clarityn 10 mg - Brausetabletten eingenommen haben als vorgesehen, informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Apotheker.

Als Zeichen einer Überdosierung wurden Schläfrigkeit, beschleunigter Herzschlag und Kopfschmerzen beschrieben.

**Wenn Sie die Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten vergessen haben**

Wenn Sie vergessen haben, Ihre Dosis rechtzeitig einzunehmen, nehmen Sie sie so bald wie möglich ein, und folgen Sie dann wieder dem normalen Behandlungsplan. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Clarityn 10 mg - Brausetabletten abbrechen**

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Clarityn 10 mg - Brausetabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren waren Kopfschmerzen, Nervosität und Müdigkeit. Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen bei Erwachsenen und Jugendlichen waren Benommenheit, Kopfschmerzen, Appetitsteigerung und Schlaflosigkeit.

Nach Markteinführung von Clarityn 10 mg - Brausetabletten wurde sehr selten über Fälle von schweren allergischen Reaktionen, Schwindel, unregelmäßigem oder schnellem Herzschlag, Übelkeit, Mundtrockenheit, Magenverstimmung, Leberproblemen, Hautausschlag, Haarausfall und Müdigkeit berichtet. Es ist nicht möglich festzustellen, wie häufig diese Reaktionen auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **5. WIE SIND CLARITYN 10 MG - BRAUSETABLETTE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Röhrchen nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen Clarityn 10 mg - Brausetabletten nicht verwenden, wenn Sie eine Veränderung des Aussehens der Brausetabletten bemerken.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Clarityn 10 mg - Brausetabletten enthalten

Der Wirkstoff ist: Loratadin 10 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, Povidon, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure wasserfrei, Sorbitol, Mannitol, Natriumcarbonat wasserfrei, 5 mg Saccharin-Natrium, 2,4 mg Saccharose-Stearat/Palmitat-Ester (E 473), Natriumcitrat, Pflanzenleuzithin (E 322) und Orangen-Aroma.

### Wie Clarityn 10 mg - Brausetabletten aussehen und Inhalt der Packung

Clarityn 10 mg - Brausetabletten sind weiße bis weißliche, runde, flache Tabletten mit Bruchkerbe auf einer Seite und sind in Aluminiumröhrchen mit 10 Brausetabletten abgepackt.

### Pharmazeutischer Unternehmer:

AESCA Pharma GmbH., Am Euro Platz 2, 1120 Wien

### Hersteller:

HERMES Pharma Ges.m.b.H., 1030 Wien

**Z.Nr.:** 1-23167

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien	Claritime 10 mg Effervescent Tablets
Dänemark	Clarityn Effervescent Tablets 10 mg
Deutschland	Lisino Brausetabletten
Frankreich	Clarityne 10 mg Comprimés Effervescents
Griechenland	Clarityne Effervescent Tablets (10 mg/tab)
Island	Clarityn Efferv 10 mg
Italien	Clarityn 10 mg Effervescent Tablet
Luxemburg	Claritime Effervescent Tablets 10 mg
Niederlande	Claritime Bruisabletten 10 mg
Österreich	Clarityn 10 mg - Brausetabletten
Portugal	Claritime EFF

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im** Februar 2009

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### Clarityn 10 mg - Tabletten

Wirkstoff: Loratadin

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen müssen Clarityn 10 mg - Tabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Clarityn 10 mg - Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten beachten?
3. Wie sind Clarityn 10 mg - Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Clarityn 10 mg - Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS SIND CLARITYN 10 MG - TABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Clarityn 10 mg - Tabletten gehören zur Gruppe der Antihistaminika. Antihistaminika helfen die Überempfindlichkeitserscheinungen (Allergien), die durch die Freisetzung eines Stoffes, genannt Histamin, der im eigenen Körper produziert wird, hervorgerufen werden, zu vermindern.

Clarityn 10 mg - Tabletten lindern Beschwerden bei allergischem Schnupfen (Heuschnupfen) mit Begleiterscheinungen wie Niesreiz und Nasenlaufen sowie Juckreiz und Brennen in Nase und Augen. Clarityn 10 mg - Tabletten sind auch zur Behandlung und Linderung der Beschwerden bei chronischem Nesselausschlag (Juckreiz, Rötung und Bläschen) geeignet. Die Linderung hält einen ganzen Tag an und hilft Ihnen Ihrer normalen Tätigkeit tagsüber nachzugehen und nachts zu schlafen.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CLARITYN 10 MG - TABLETTEN BEACHTEN?**

#### **Clarityn 10 mg - Tabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Loratadin oder einen der sonstigen Bestandteile von Clarityn 10 mg - Tabletten sind.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten ist erforderlich**

Bevor Sie Clarityn 10 mg - Tabletten einnehmen, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker:

- wenn Sie eine Leberfunktionsstörung haben.

#### **Bei Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht

verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Labortests:**

Wenn Sie einem Labor-Haut-Allergietest unterzogen werden sollten Clarityn 10 mg - Tabletten mindestens 2 Tage vor einem geplanten Test abgesetzt werden, da dieses Medikament die Testergebnisse beeinflussen kann.

**Bei Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Clarityn 10 mg - Tabletten können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

Clarityn 10 mg - Tabletten steigern nicht die Wirkung von gleichzeitig eingenommenem Alkohol.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Von einer Anwendung von Clarityn 10 mg - Tabletten während der Schwangerschaft wird abgeraten.

Von einer Anwendung von Clarityn 10 mg - Tabletten während der Stillzeit wird abgeraten. Loratadin geht in die Muttermilch über.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Die Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten in der empfohlenen Dosis verursacht voraussichtlich keine Benommenheit oder Verminderung Ihrer Aufmerksamkeit. Jedoch kann es bei manchen Personen in sehr seltenen Fällen zu Benommenheit kommen, was zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen führen kann.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Clarityn 10 mg Tabletten:**

Clarityn 10 mg - Tabletten enthalten eine geringe Menge an Lactose (Milchzucker).

Sollte Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt haben, dass Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckerarten leiden, informieren Sie ihn bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

**3. WIE SIND CLARITYN 10 MG - TABLETTEN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Clarityn 10 mg - Tabletten immer genau nach Anweisung des Arztes/Empfehlung des Apothekers ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Kinder (12 Jahre und älter):

Nehmen Sie eine Tablette einmal täglich mit einem Glas Wasser, unabhängig von den Mahlzeiten, ein.

Kinder von 2 bis 12 Jahren erhalten eine gewichtsbezogene Dosierung:

Bei einem Körpergewicht von über 30 kg: Nehmen Sie eine Tablette einmal täglich mit einem Glas Wasser, unabhängig von den Mahlzeiten, ein.

Darf Kindern unter 12 Jahren nur über ärztliche Verschreibung verabreicht werden.

Patienten mit schwerer Leberschädigung:

Bei erwachsenen Patienten und Kindern über 30 kg Körpergewicht:

Nehmen Sie eine Tablette alle zwei Tage mit einem Glas Wasser, unabhängig von den Mahlzeiten, ein.

Von einer Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten bei Kindern unter 2 Jahren wird abgeraten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Clarityn 10 mg - Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten**

Nehmen Sie Clarityn 10 mg - Tabletten nur in der vorgegebenen Menge ein. Es werden bei irrtümlicher Überdosierung keine schwerwiegenden Nebenwirkungen erwartet.

Sollten Sie jedoch mehr Clarityn 10 mg - Tabletten eingenommen haben als vorgesehen, informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Apotheker.

Als Zeichen einer Überdosierung wurden Schläfrigkeit, beschleunigter Herzschlag und

Kopfschmerzen beschrieben.

**Wenn Sie die Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten vergessen haben**

Wenn Sie vergessen haben, Ihre Dosis rechtzeitig einzunehmen, nehmen Sie sie so bald wie möglich ein, und folgen Sie dann wieder dem normalen Behandlungsplan. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Clarityn 10 mg - Tabletten abbrechen**

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Clarityn 10 mg - Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren waren Kopfschmerzen, Nervosität und Müdigkeit. Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen bei Erwachsenen und Jugendlichen waren Benommenheit, Kopfschmerzen, Appetitsteigerung und Schlaflosigkeit.

Nach Markteinführung von Clarityn 10 mg - Tabletten wurde sehr selten über Fälle von schweren allergischen Reaktionen, Schwindel, unregelmäßigem oder schnellem Herzschlag, Übelkeit, Mundtrockenheit, Magenverstimmung, Leberproblemen, Hautausschlag, Haarausfall und Müdigkeit berichtet. Es ist nicht möglich festzustellen, wie häufig diese Reaktionen auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE SIND CLARITYN 10 MG - TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für das Arzneimittel sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zur Aufbewahrung erforderlich.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen Clarityn 10 mg - Tabletten nicht verwenden, wenn Sie eine Veränderung des Aussehens der Tabletten bemerken.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Clarityn 10 mg - Tabletten enthalten**

Der Wirkstoff ist: Loratadin 10 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Maisstärke und Magnesiumstearat.

**Wie Clarityn 10 mg - Tabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Clarityn 10 mg - Tabletten sind weiße bis weißliche, ovale, flache Tabletten mit einer Bruchkerbe und „10“ auf einer Seite in Packungsgrößen zu 2, 5, 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50 oder 100 Tabletten. Es

müssen nicht alle Packungsgrößen auf dem Markt sein.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

AESCA Pharma GmbH,  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien

**Hersteller:**

Schering-Plough Labo NV,  
Industriepark 30  
B-2220 Heist-op-den-Berg  
Belgien

Schering-Plough  
Rue Louis Pasteur, 2  
F-14200 Herouville Saint Clair  
Frankreich

**Z.Nr.:** 1-19490

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien	Claritine 10 mg Tablets
Dänemark	Clarityn Tablets 10 mg
Deutschland	Lisino S
Finnland	Clarityn 10 mg Tablets
Frankreich	Clarityne 10 mg Comprimés
Griechenland	Clarityne Tablets (10 mg/tab)
Irland	Clarityn 10 mg Tablets
Island	Clarityn Tabl 10 mg
Italien	Clarityn 10 mg Tablet
Luxemburg	Claritine 10 mg Tablets
Niederlande	Claritine Tabletten 10 mg
Norwegen	Clarityn 10 mg Tablets
Österreich	Clarityn 10 mg - Tabletten
Portugal	Claritine Tablets
Schweden	Clarityn Tabl 10 mg
Spanien	Clarityne Tablets
UK	Clarityn Allergy 10 mg Tablets
UK	Clarityn 10 mg Tablets
UK	Boots Hayfever Relief One a Day 10 mg Tablets

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im: Februar 2009**